

Eczema por Infecção de Vias Aéreas Superiores

Resumo

Introdução: os autores apresentam um caso de eczema perioral associado à infecção de vias aéreas superiores. **Descrição do caso:** masculino, um ano e meio apresentando lesões eritematodescamativas, com fissuras na região perioral. A mãe refere que a criança tinha a compulsão de secar os lábios com a língua e noturnamente dorme mal e ronca. A criança já havia apresentado outras infecções de vias aéreas superiores (IVAS) anteriormente. A família estava aplicando um corticóide de média potência há alguns dias com piora e relato de ardência no local. Foi pedido radiografia de seios da face que mostrou velamento dos seios maxilares. Prescrito amoxicilina com clavulanato oral por quinze dias. O uso tópico de óleo vegetal de vitamina E, associado ao óxido de zinco, foi empregado com o objetivo de reduzir a sensação de ardor na pele da criança. A resposta foi satisfatória após a antibioticoterapia, havendo desaparecimento das lesões. **Comentário:** as dermatites peri orais são causadas por diversos agentes, entre eles o Dermodex folliculorum. O corticóide é usado erroneamente, como ação antiinflamatória e eczematosa, na presença de irritação e descamação das lesões localizadas nos lábios. Outro erro é o emprego de associações do mesmo com antifúngicos e antibióticos tópicos. A sensibilização local desses agentes podem provocar sequelas irreparáveis em uma criança pequena. **Conclusão:** O quadro crônico de IVAS já havia sido relatado pela família. Porém, o menor não apresentava febre, apesar da obstrução respiratória. Deve-se pensar numa criança pequena que lesões dermatológicas podem estar associadas as manifestações sistêmicas.

Responsável

Larissa Maciel Baptista

Autores

Silva, P.G.⁽¹⁾; Baptista, L.M.⁽²⁾; Peixoto, A.B.⁽³⁾; Cerqueira, F.G.⁽⁴⁾; Moriguti, N.A.⁽⁵⁾; Cerqueira, A.M.M.⁽⁶⁾.

Instituição

Hospita Municipal Jesus