

Quadro de Esteatose Hepática em Lactente . Tratamento Homeopático como Opção Segura.

Resumo

Introdução: A esteatose hepática é o estágio inicial da doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) que apresenta-se como um problema clínico emergente, principalmente entre pacientes obesos (fator associado mais comum). A alteração laboratorial é o aumento persistente dos níveis de transaminases, com maior elevação da TGP em relação a TGO. Outras situações associadas à EHNA é a terapêutica com alguns fármacos como exemplo os glicocorticóides. A prevalência da esteatose aumenta com a idade sendo 0,7% de 2- 4 anos e 17,3 dos 15-19 anos. A ultrassonografia hepática é um bom método para identificar fígado gorduroso. Não há terapêutica específica definitiva até o momento. O objetivo deste estudo foi descrever o caso de um lactente apresentando-se com esteatose hepática, tratado homeopaticamente com equalização do fígado e conseqüente normalização laboratorial e ultrassonográfica. Relato de caso: Lactente, 16 meses ,história de obesidade, crises de broncoespasmo de repetição e uso crônico de glicocorticóides. Aos 6 meses de em investigação de obesidade, foi encontrado esteatose hepática ao USG abdominal, com aumento das transaminases laboratorialmente. Iniciou tratamento homeopático com necessidade de equalização hepática, devido a lesão orgânica (fígado). Posterior normalização das transaminases e redução do grau de esteatose ao USG. **Comentários:** Este caso evidenciou um quadro de esteatose hepática em idade precoce, o que pode ser explicado pelo uso repetido e contínuo de medicação glicocorticóide. Foi priorizado no tratamento

Responsável

Danielle Da Silva Barbas

Autores

Barbas, D.S.; Cabo, D.J.V. ; Magalhães, J.Q. Carillo, R.Jr; Hall, L. Xavier. M.F.

Instituição

Universidade Federal Fluminense (UFF), Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia (ABRAH)